Stenogyra (? Opeas) superba Mlldff.

T. rimata, ventricosulo-turrita, sat solida, oblique curvatim striatula et lineis spiralibus decussata, viridescenti-flavida; apex obtusus. Anfr. 9 convexiusculi, sensim accrescentes, ultimus inflatus, non descendens. Apertura obliqua, truncato-ovalis, peristoma expansiusculum, valde incrassatum, margine columellari dilatato, subtus non truncato nec torto.

Alt. 40, lat. 11 $^1/_2$ mm, apert. 10 mm alta, 7 $^1/_2$ lata.

Hab. ad urbem Hêng-shan-hsien provinciae Hunan, leg. cl. P. K. Fuchs.

Obs. Propter rimam umbilicarem et formationem columellae sectioni Opeadi adnumeranda videtur, sed statura maxima et peristomate incrassato a speciebus typicis valde devians.

Catalog der Gattung Chilina.

(Nach Edg. A. Smith in Pr. Z. S. 1881 p. 842).

amoena Smith Pr. Z. S. 1881 p. 37 pl. 4 fig. 18.
Südwestpatagonien.

angusta Phil. Reise Atacama p. 185.
Wüste Atacama.

bulloides d'Orb. Voy. Amer. merid. p. 335 pl. 43 fig 18. — Hupé in Gay Chile III. pl. 3 fig. 10.
(ampullacea Sow. Conchol. Illustr. fig. 3. — Conch. Icon. fig. 8. — M. Ch. II. pl. 10 fig. 12).
Chiloë.

Dombeyana Brug. Enc. méth. VI. p. 335. (Auricula) Lam. ed. II. vol. VIII. p. 331. — M. Ch. II. t. 9 fig. 18. 19. — Sow. Conch. Illustr. fig. 11. — Conch. Icon. sp. 4. —
(fluctuosa Sow. Conch. Ill. fig. 2. — Conch. Ic. sp. 2, nec Gray).

(Conovulus bulimoides Lam. Enc. méth. pl. 459 f. 7 a).
(Auricula fluviatilis Lesson Voy. Coq. p. 342)
Chile.

fasciata (Dombeya) Gould Otia p. 41. — Expl. Exped. pl. 9 fig. 145. — Sow. Conch. Icon. sp. 15.
(acuminata Sow. Conch. Icon. sp. 6).
Rio Concon, Chile.

fluctuosa Humphr. Mus. Calonn. p. 62. — Gray Spic. zool. p. 5 pl. 6 fig. 19. — d'Orb. Amér. mérid. pl. 43 fig. 13–16: — M. Ch. II. pl. 9 fig. 7—9.
var. *tenuis* Sow. Conch. Ill. fig. 12. — Conch. icon. sp. 14.
var. *ovalis* Sow. Conch. Ill. fig. 6. — M. Ch. II. t. 9 fig. 12—14.
var. *elegans* Frauenf. Verh. zool. bot. Ges. 1866 p. 196 (cum figura).
Chile.

fluminea (Voluta) Maton Trans. Linn. Soc. 1809 pl. 24 fig. 14. 15. — Sow. Conch. Illustr. fig. 7. — Conch. icon. fig. 2. — M. Ch. II. pl. 9 fig. 15–17; pl. 10 fig. 10. 11. — d'Orb. Voy. Amér. mérid. pl. 43 fig. 19. 20. — Heynemann Mal. Bl. XV. pl. 5 fig. 11.
(fluviatilis Maton l. c. fig. 13).
Rio de la Plata. Südbrasilien.

gibbosa Sowerby Conch. Illustr. fig. 4. — Conch. icon. sp. 9. — M. Ch. II. t. 10 fig. 13. 14.
(tehuelcha d'Orb. Voy. Amér. mérid. pl. 43 fig. 6. 7. — Sow. Conch. Ill. fig. 9. — Conch. icon. sp. 12).
Patagonien.

globosa Frauenfeld Verh. zool. bot. Ges. 1866 p. 187 (cum fig.)
La Plata.

major Sow. Conch. Ill. fig. 10. — Conch. icon sp. 3. — ?M. Ch. II. pl. 9 fig. 12.
Valdivia.

obovata Gould (Dombeya) Otia p. 41, — Moll. Wilke Expl. Exped. pl. 9 fig. 143.
Rio Concon, Chile.

Parchappi d'Orb. Voy. Amér. mérid. p. 338 pl. 43 fig. 45. — Sow. Conch. Ill. fig. 8. — M. Ch. II. pl. 10 fig. 5—7. — Sow. Conch. icon. sp. 17.
Pampas von Argentinien.

parva Martens Mal. Bl. XV. p. 185.
Südbrasilien.

patagonica Sow. Conch. icon. sp. 11.
Patagonien.

portillensis Hidalgo Journ. Conch. 1880 p. 522 pl. 11 fig. 1.
Patagonische Anden.

puelcha d'Orb. Voy. Amér. mérid. pl. 43 fig. 8—12. — ?Sow. Conch. Ill. fig. 13. — M. Ch. II. t. 9 fig. 5. 6. — (pulchra Woodw. Manual ed. III. fig. 129).
Rio Negro, Patagonien.

robustior Sow. Conch. Ill. fig. 1. — Conch. icon. sp. 5. — M. Ch. II. t. 10 fig. 1. 1.
Südamerika.

subcylindrica Sow. Conch. icon. sp. 16.
Nord-Chiloe.

Untergattung Pseudochilina Dall.

limnaeformis Dall Ann. Lyc. New-York 1870 vol. XI. p. 357.
Chile.